clinical cases DDIs

Fecha del informe 13 May 2019

Interacción del caso reportado entre **Atazanavir** y **Omeprazol**

Fármacos implicados

Víctima
Atazanavir

Dosis Diaria
300 (mg)

Ajuste de dosis realizado
No

Vía de administración del fármaco
Oral

Fecha de inicio
30 de abril de 2013

Fecha de finalización
En curso

Causante
Omeprazol

Dosis Diaria
20 (mg)

Ajuste de dosis realizado
No

Vía de administración del fármaco
Oral

Fecha de inicio
Desconocido

Fecha de finalización
En curso

Lista completa de los medicamentos que toma el paciente

Tratamiento antirretroviral

Ritonavir
Raltegravir
Atazanavir (with Ritonavir or Cobicistat)

Lista completa de todos los medicamentos que toma el paciente, incluidos los implicados en la interacción

Omeprazol, lormetazepam

Descripción del caso clínico

Sexo al nacer

Masculino

Edad

58

eGFR (mL/min)

>60

Deterioro de la función hepática

Sí

Child-Pugh

Child-Pugh A

Descripción

Este paciente con coinfección VHC y cirrosis hepática fue diagnosticado con úlcera gástrica y diverticulitis, requiriendo tratamiento con omeprazol en dosis entre 20 y 40 mg/día. No se observó pérdida de eficacia de ATV/R. Presentó episodios de hiperbilirrubinemia, pero actualmente los niveles son normales. La carga viral actual es indetectable.

Resultado clínico

No resultado indeseado

Comentario del comité editorial

La coadministración de atazanavir con inhibidores de la bomba de protones no se recomienda. La administración de omeprazol (40 mg una vez al día) disminuyó la Cmax, el AUC y el Cmin de atazanavir en un 96%, 94% y 95%, respectivamente, cuando se administró 2 horas antes de atazanavir (400 mg, una vez al día). Si la coadministración se considera inevitable, se recomienda un monitoreo clínico cercano y las dosis de omeprazol no deben exceder los 20 mg y deben tomarse aproximadamente 12 horas antes del atazanavir.

Recomendación Universidad de Liverpool

- Estos fármacos no deberían coadministrarse

Para más información clic aquí